



- Indicazioni immediatamente applicabile.
- Nelle zone di pressione, la pelle non deve essere lesionata né esserci ipersensibilità.
- Anche se l'ortesi non è per uso singolo, deve essere utilizzata da un solo paziente. Non riutilizzare su altri pazienti.
- L'uso corretto dell'ortesi dipende dalla condizione degli elementi che la costituiscono e quindi deve essere controllata periodicamente. Il personale sanitario che segue del trattamento del paziente può indicare allo stesso l' idoneità del prodotto o una eventuale sostituzione.
- Se il prodotto si è deteriorato o usurato.
- Si consiglia di curare la pulizia delle chiusure rapide con microgranci per conservarne la funzionalità, eliminando i materiali che potrebbero esservi rimasti attaccati.
- Pulire periodicamente il prodotto e mantenere una corretta igiene personale.
- Consultare il proprio medico per sapere se l'ortesi può essere rimossa durante il bagno o la doccia; in caso contrario coprire o proteggere l'ortesi dall'acqua.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo.
- Alcuni materiali del prodotto non sono ignifughi, pertanto

ortoped, osv.)

- Folg altid den generelle brugsanvisningen og de specielle anvisningene som du får av legen din.
- Legen er den personen som er kvalifisert til å forekskrive og bestemme varigheten av behandlingen, samt oppfølgingen.
- Legen bør ta hensyn til mulig topisk bruk av kremer sammen med anvendelse av ortosen. Hvis du opplever bivirkninger, hudreaksjoner eller sensiblisering, oppsøk lege straks. I trykkmåleren skal huden ikke være skadet eller overfølsom.
- Selv om ortosen ikke er til engangsbruk, er den bare til en braker. Bruk ikke om igjen på andre pasienter.
- Riktig bruk av ortosen er avhengig av tilstanden på elementene som utgjør det hele, og derfor skal den kontrolleres med jevne mellomrom. Helsepersonellet som er ansvarlig for oppfølgingen av behandlingen av pasienten, kan avgjøre om produktet er brukelig eller om det er nødvendig å bytte det ut hvis produktet er forringet eller utslitt.
- Det anbefales at mikrokrøkene holdes rene ved å fjerne materialer som kan sette seg fast på dem for å sikre funksjonaliteten.
- Vask produktet regelmessig, og

## PT

**Descrição e utilização prevista:**

Tala extensora do dedo. Dispõe de um suporte adaptável em forma de anel na zona dorsal do nó e almofadas ergonómicas resistentes para as zonas distal e palmar. A estrutura é formada por uma mola regulável que mantém a extensão do dedo e permite a flexão se for necessário realizar movimentos reabilitadores. As dimensões do produto segundo o modelo variam de 70 mm a 90 mm de comprimento e 57 mm de largura.

**Indicações:**

Tratamento para a retração ou a lesão do tendão flexor das articulações interfalangeas de um dedo. Retração tissular na face palmar do dedo ou das articulações digitais. Extensão pós-operatória e pós-traumática de articulação interfalângica proximal.

**Precauções:**

- Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar a ortótese. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico ou o estabelecimento onde tiver adquirido o produto.
- Para que a ortótese possa desempenhar a sua função, deve ser ajustada corretamente à morfologia do doente. A primeira colocação e regulação da ortótese deve ser realizada sob a supervisão de pessoal qualificado

## RU

**Описание и предполагаемое использование:**

Шина для разгибания пальца. Имеет адаптируемую опору в форме кольца, расположенную в дорсальной области сустава пальца, и эргономичные устойчивые подушечки для дистальной и ладонной области. Ее конструкция состоит из регулируемой пружины, которая поддерживает разгибание пальца и позволяет ему сгибаться при необходимости выполнения реабилитационных движений. Размеры изделия в зависимости от модели варьируются от 70 мм до 90 мм в длину и 57 мм в ширину.

**Показания:**
Лечение контрактуры или повреждения сухожилия сгибателя межфаланговых суставов пальца. Контрактура тканей на ладонной поверхности или в суставах пальцев. Послеоперационное и посттравматическое выпяжение проксимального межфалангового сустава.

**Меры предосторожности:**

- Внимательно прочитайте инструкции перед использованием ортеза. В случае сомнений обратитесь к врачу или в магазин, где вы приобрели изделие.
- Чтобы ортез мог выполнять

кীবом прvej прста. Pozri obr. 3.

V prípade, že ortéza nevývija dostatočný tlak na správne udržanie extenzie prstov, upravte ortézu jmeným stlačením koncevoj podložky dlahy smerom nahor. Operáciu opakujte, kým nedosiáhnete primerané predĺženie prsta. Pozri obr. 4. Ak zistíte, že dlaha vyvíja nadmerný tlak na prst pacienta, vykonajte opačnú operáciu a jemne zatlačte na dlahu z koncov dlahy, kým sa tlak nezniží a ortéza sa nebude nosiť pohodlne. Pozri obr. 5.

**Poznámka:** Po vykonaní prvého nastavenia zaoberajte toto nastavenie aj pri odstránení výstuhu, iba ak si pacient všimne, že ortéza nedrží správnu extenziu, bude pri znižení opuchu palca potrebné upraviť nastavenie.

**Údržba produktu - Návod na čistenie:**

Ortézu pravidelne ručne umývajte handričkou navlhčenou vo vode a potom ju vysušte. Nepoužívajte bieliadla, abrazívne mydlá, neželiate, nečistite chemicky. Nevystavujte hlavamiu zdrojom tepla, ako sú sporáky, ohrievacie radiátory, priame slnečné žiarenie atď.

**Poznámka:** Akákoľvek vážna nehoda súvisiaca s výrobkom musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ a/alebo pacient žije.

iztenjigovosti prsta. Glejte sliko 4

Če opazite, da oprornica premočno pritiska na prst, izvedite nasprotni postopek in previdno pritiskajte oprornico od skrajnih koncev navzdol, dokler se pritisk ne zmanjša in je oprornica med uporabo udobna. Glejte sliko 5.

**Opomba:** Ko je opravljena prva nastavitvev, ohranite to nastavitvev pri odstranjevanju oprornice. Prilagoditev bo treba nastaviti le za zmanjšanje vnetaj prsta, če pacient opazi, da oprornica ne zagotavlja pravilne iztenjigovosti.

**Vzdrževanje izdelka – Navodila za pranje:**

Oprornico občasno ročno obrišite z vlažno krpo in jo nato osušite. Ne uporabljajte belila ali abrazivnih mil, ne likajte in ne čistite kemično. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote kot so peči, greli, radiatori ter ga ne neposredno izpostavljajte soncu ipd.

**Opomba:** Vsak resen incident, povezan z izdelkom, je potrebno sporočiti proizvajalci in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

Si consiglia di non utilizzarlo a livello del basso sulla stecca dalla estremità della stessa fino a ridurre la pressione e rendere l'ortesi confortevole durante l'uso. (figura 5).

**Nota:** dopo aver regolato l'ortesi la **prima volta, mantenere la configurazione quando viene rimossa. Sarà necessario modificare la regolazione quando diminuirà l'infiammazione al dito se il paziente nota che l'ortesi non mantiene correttamente l'estensione.**

**Mantenimento del prodotto - Istruzioni di lavaggio:**

Lavare periodicamente a mano l'ortesi utilizzando un panno umidinato con acqua e poi asciugarla. Non usare candeggina, detersigenti abrasivi, non stritare, non lavare a secco. Non esporre a fonti di calore dirette come stufe, caloriferi, radiatori, raggi solari diretti, ecc.

**Nota:** Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere comunicato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.

## NL

**Beschrijving en beoogd gebruik:**

Vingerextensiespalk De spalk komt met een aanpasbare ringvormige steun aan de achterkant van de knokkel en stevige ergonomische pelotten voor de distale en palmaire

pà skinnen. Gjentá operasjonen til tilstrekkelig forlengelse av fingeren er oppnådd (se figur 4).

Hvis det merkes at skinnen utøver for stort trykk på pasientens finger, gjør det motsatte og trykk forsiktig ned på skinnen fra endene av denne for å oppnå redusert trykk og ortosen føles komfortabel under bruk. (figur 5).

**Merk:** når den første justeringen er gjort, oppretthold justeringen når du fjerner ortosen. Det vil kun være nødvendig å modifisere justeringen hvis en eventuell betenelse i fingeren går ned og dersom pasienten merker at ortosen ikke opprettholder ekstensjonen riktig.

**Vedlikehold av produktet – vaskeanvisninger:**

Vask ortosen med jevne mellomrom for hånd med en klut fuktet med vann og tørk. Ikke bruk blekemiddel eller skuremiddel, ikke stryk, ikke tørrens. Ikke utsett ortosen for direkte varmekilder som peis, varmeovner, radiatorer, direkte sollys, etc.

**Merknad:** Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med produktet må rapporteres til produsenten og til vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

possam ter aderido os mesmos.

- Limpar periodicamente o produto e mantenha uma correta higiene pessoal.
- Consultar ao médico se pode retirar a ortótese durante o banho ou o duche; caso contrário, cobrir ou proteger a ortótese da água.
- Não deixar que as crianças brinquem com este dispositivo.
- Alguns materiais do produto são NÃO ignífugos, pelo que é recomendável não o utilizar em ambientes com demasiado calor, fogo ou radiações.

**Instruções de colocação e ajustamento:**

- Introduzir o dedo entre as almofadas distal e palmar que devem ser colocadas na face interna do dedo, ficando a almofada que assenta na zona do nó (almofada medial) na face externa do mesmo (ver Fig. 1).
- Para adaptar a tala de maneira correta, apertar as abas ajustando-as ao diâmetro da articulação metacarpofalangeal proximal. Ver Fig. 2.
- Deixis de colocada, a tala deve ficar de tal maneira que a almofada palmar seja posicionada sobre a articulação metacarpofalangeal do dedo e a almofada distal sobre a articulação da primeira falange do dedo (ver Fig. 3).

Caso a ortótese não exerça a pressão

конкретного пациента. Не применять для других пациентов.

Правильность использования ортеза зависит от состояния формирующего его элементов, поэтому его необходимо регулярно проверять. Медицинский персонал, который контролирует состояние пациента, может определить пригодность изделия или указать на необходимость его замены, если ортез поврежден или изношен.

Рекомендуется проводить ортотический массаж, чтобы они сохранили свои качества, удаляя излишки материала. Повторяйте операцию до тех пор, пока не будет достигнута нужная степень разгибания пальца. См. рис.4.

В случае, если замечено, что шина оказывает чрезмерное давление на палец пациента,

не применяйте для других пациентов. Правильность использования ортеза зависит от состояния формирующего его элементов, поэтому его необходимо регулярно проверять. Медицинский персонал, который контролирует состояние пациента, может определить пригодность изделия или указать на необходимость его замены, если ортез поврежден или изношен.

Рекомендуется проводить ортотический массаж, чтобы они сохранили свои качества, удаляя излишки материала. Повторяйте операцию до тех пор, пока не будет достигнута нужная степень разгибания пальца. См. рис.4.

В случае, если замечено, что шина оказывает чрезмерное давление на палец пациента, не применяйте для других пациентов. Правильность использования ортеза зависит от состояния формирующего его элементов, поэтому его необходимо регулярно проверять. Медицинский персонал, который контролирует состояние пациента, может определить пригодность изделия или указать на необходимость его замены, если ортез поврежден или изношен.

**Инструкции по надеванию и примерке:**

- Введите палец между дистальной и ладонной подушечками, которые должны располагаться на внутренней стороне пальца, оставив подушечку, лежащую в области сустава (медиальная подушечка), снаружи сустава. См. рис.1.
- Для правильной адаптации шины сомкните боковые пластины, адаптировав их к диаметру проксимального пístico-фалангового сустава. См. рис.2
- После того, как шина наложена, она должна располагаться так, чтобы ладонная подушечка располагалась на пístico-фаланговом суставе пальца, а дистальная подушечка — под дистальным межфаланговым суставом пальца. См. рис.3.

В случае, если ортез не оказывает достаточного давления для поддержания правильного разгибания пальца, то ортегулируйте ортез, осторожно нажимая по направлению вверх на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления для поддержания правильного разгибания пальца, то ортегулируйте ортез, осторожно нажимая по направлению вверх на кончик шины.

**Уход за изделием – инструкции по стирке:**
Периодически стирайте ортез вручную, используя ткань, смоченную водой, а затем вытирайте насухо. Не используйте отбеливатель или абразивное мыло, не гладьте, не подвергайте химической чистке. Не подвергайте воздействию прямых источников тепла, таких как печи, обогреватели, радиаторы, прямому воздействию солнца.

**Примечание:** О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрированы пользователи и/или пациент.

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

не применяйте для других пациентов. Периодически стирайте ортез вручную, используя ткань, смоченную водой, а затем вытирайте насухо. Не используйте отбеливатель или абразивное мыло, не гладьте, не подвергайте химической чистке. Не подвергайте воздействию прямых источников тепла, таких как печи, обогреватели, радиаторы, прямому воздействию солнца.

**Примечание:** О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрированы пользователи и/или пациент.

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

не применяйте для других пациентов. Периодически стирайте ортез вручную, используя ткань, смоченную водой, а затем вытирайте насухо. Не используйте отбеливатель или абразивное мыло, не гладьте, не подвергайте химической чистке. Не подвергайте воздействию прямых источников тепла, таких как печи, обогреватели, радиаторы, прямому воздействию солнца.

**Примечание:** О любом серьезном инциденте, связанном с продуктом, необходимо сообщить производителю и компетентному органу государства-члена, в котором зарегистрированы пользователи и/или пациент.

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,

выполните противоположные действия, осторожно нажимая по направлению вниз от подушечек на кончик шины. Если шина не оказывает достаточного давления на палец пациента,